

SCHEDA TECNICA

KAVMOS



COMPOSIZIONE

1 ml contiene: acepromazina maleato 17,6 mg (pari ad acepromazina 13 mg)

POSOLOGIA E MODALITÀ D'USO

La dose da impiegare va scelta in base alla profondità dell'effetto desiderato:

- **tranquillizzare l'animale durante l'addestramento:** 0,25 - 0,50 ml/100 kg p.v.
 - **trasporto di cavalli relativamente calmi:** 0,30 - 0,70 ml/100 kg p.v.
 - **effetto sedativo di media intensità** (trasporto di animali agitati, endoscopia.): 1 ml - 1,5 ml/100 kg p.v.
 - **effetto sedativo più intenso** (preanestesia, esami clinici dolorosi): 1,5 ml - 2 ml/100 kg p.v.
- L'effetto sedativo inizia a scomparire in un periodo variabile da 3 a 12 ore, in funzione della dose somministrata

AVVERTENZE SPECIALI

Equidi non destinati alla produzione di alimenti

CONFEZIONE

Scatola da 3 siringhe multidose da 15 ml l'una

DESCRIZIONE

L'**acepromazina**, derivato fenotiazinico, viene impiegata come agente tranquillante, sedativo e pre-anestetico.

Agisce tramite il blocco della dopamina, catecolamina neurotrasmettitrice a livello encefalico, con effetto depressivo del sistema nervoso centrale; questo determina nell'animale uno stato di tranquillità associato a rilassamento muscolare e riduzione dell'attività spontanea.

I segni clinici dell'effetto tranquillante compaiono circa 30-45 minuti dopo la somministrazione per via orale e si manifestano con ptosi palpebrale, procidenza della terza palpebra, orecchie abbassate e prolasso del pene. Anche se sonnolenti, gli animali mantengono generalmente la stazione quadrupedale e, se dovessero porsi in decubito, possono essere solitamente persuasi ad alzarsi. Kavmos è indicato quando è utile ottenere un effetto tranquillante-sedativo:

- in occasione di trasporti
- in soggetti eccitati o aggressivi, soprattutto se sottoposti a manipolazioni che possono risultare mal tollerate
- per tranquillizzare i cavalli durante l'addestramento
- per la sedazione di base in occasione di interventi di chirurgia minore (endoscopia, esami diagnostici, radiologici..)
- come terapia collaterale nelle laminiti per effetto di vasodilatazione periferica

CODICE PRODOTTO

GTIN: 08033501880156 - AIC: 100056023

