

## ELECTROLYTE C PASTA ORALE

Il prodotto è indicato per la compensazione delle perdite elettrolitiche in caso di sudorazione elevata durante sforzi muscolari impegnativi, per il recupero del potenziale atletico e della condizione fisica.

Il prodotto contiene:

- **Zuccheri fosforilati:** aumentano la disponibilità immediata di ATP
- **Estratti di olivo, betaglucani e vitamina C:** antiossidanti per la salvaguardia dell'integrità dell'epitelio intestinale
- **Proteine del latte** estremamente pure (senza la presenza di lattosio) e di **estratti idrolizzati di proteine di lievito:** forniscono proteine e peptidi in grado di agganciare gli ioni degli elettroliti e trasportarli attraverso le pareti cellulari all'interno delle cellule stesse.
- **Arginina:** libera le cellule dalle scorie azotate che vi si formano a causa dell'aumentato metabolismo proteico



### COMPOSIZIONE

Glicerolo • potassio cloruro • prodotto ottenuto da *Aspergillus oryzae* ricco in proteine • fosfato monosodico • cloruro di sodio • fosfato bisodico • melasso di canna idrolizzato (Dextrophos) • cloruro di calcio • pareti cellulari da *Saccharomyces cerevisiae* • proteina di latte in polvere • estratto di lievito • saccarosio • amido di mais pregelatinizzato • solfato di magnesio eptaidrato • semi di piantaggine

### ADDITIVI/Kg

*Conservanti:* potassio sorbato (E202) 1,2 g; *Vitamine:* vitamina C (3a300) 4,5 g; *Aromi:* glicina (2b17034) 25 g, L-arginina (2b17003) 3 g, estratto di oliva 1 g

### CONFEZIONE

Siringa pasta orale da 50 g

### ISTRUZIONI PER L'USO

Il metodo di utilizzo deve essere adattato a alla durata e all'intensità dell'esercizio eseguito dal cavallo (500kg).

- Lavoro pesante (160-210 min di cammino, trotto e canter): 50 g (1 siringa).

Da mescolare con mangime o acqua.

Somministrare per 1 a 3 giorni dopo una forte sudorazione.

Dell'acqua deve essere disponibile per almeno 20 minuti o preferibilmente per 1 ora dopo la somministrazione.

Monitorare l'abbeveraggio, se si osserva un'insufficiente assunzione di acqua dovrebbe essere richiesto il parere di un veterinario.

